

Duplicação da veia cava inferior

Duplication of the inferior vena cava

Apresenta-se o caso de um doente do sexo masculino, com 83 anos de idade, que no decurso de investigação de quadro de suboclusão intestinal realizou uma tomografia axial computadorizada (TAC) (Fig. 1 y 2), que revelou a presença de duas veias cavas inferiores (setas brancas), unindo-se imediatamente na porção pré-hepática (variante do normal). Pode observar-se a artéria aorta, com calcificações, entre ambas as veias cavas inferiores.

O desenvolvimento da veia cava ocorre entre a 6^a e 10^a semanas de gestação, a partir da veia supracardinal direita, enquanto que a veia supracardinal esquerda involui. A sua duplicação ocorre como resultado da persistência de ambas as veias supracardinais (direita e esquerda) e tem uma prevalência estimada de 0.2-0.3%.

Geralmente, é uma anomalia assintomática, detectada acidentalmente em exames imagiológicos. Contudo, o seu diagnóstico é importante, uma vez que a sua presença tem implicações clínicas relevantes, nomeadamente no tratamento de doenças tromboembólicas.

Diagnóstico:

Duplicação da Veia Cava Inferior

João Faria¹, Rui Moço¹

¹Serviço de Medicina Interna. Hospital Pedro Hispano. Matosinhos. Portugal

Como citar este artigo: Faria J, Moço R

Duplicação da Veia Cava Inferior. *Galicia Clin* 2012; 73 (3): 133

Recibido 24/06/2012; Aceptado 26/06/2012

Figura 1 y 2

