

Abdominal pain after aortic valve surgery. Type A aortic dissection

Mujer de 66 años, con antecedentes de hipertensión arterial y fibrilación auricular. Intervenida de sustitución valvular aórtica por estenosis severa con colocación de bioprótesis. Una semana después de la intervención quirúrgica, presenta un cuadro de dolor abdominal opresivo, asociado a distensión abdominal y deposiciones blandas. Dados los antecedentes se realiza una tomografía computarizada (TC) con reconstrucción angioVR (volumen rendering), donde se observa una disección de aorta tipo A según la clasificación de Stanford (fig. 1), con una estenosis significativa en el inicio del tronco celiaco y arteria mesentérica superior, con repermeabilización distal, naciendo ambas ramas de la luz verdadera de la disección (fig. 2). Se decidió realizar una intervención quirúrgica urgente con mala evolución en el posoperatorio, falleciendo la paciente a las 48 horas tras la cirugía. Incidir en la importancia de los antecedentes personales del paciente y su correlación temporal para poder realizar un posible diagnóstico de sospecha.

Diagnóstico:

Disección de Aorta tipo A

Sergio Vázquez Rodríguez¹, Javier Alejandro Pinto²

¹Servizo de Aparato Dixestivo. ²Servizo de Radiodiagnóstico.

Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP). SERGAS

Como citar este artículo: Vázquez Rodríguez S, Pinto JA.

Dolor abdominal tras cirugía valvular aórtica. Disección de Aorta tipo A. *Galicia Clin* 2011; 72 (4): 195

Recibido: 14/5/2011; Aceptado: 7/6/2011

